



FACULTAD DE FARMACIA

Grado en Farmacia

Intervenciones desde la farmacia comunitaria en los pacientes adultos que reciben atención de la salud a domicilio: revisión exploratoria.

Memoria de Trabajo Fin de Grado

Sant Joan d'Alacant

Mayo 2020

Autor: Jessica Sánchez Moya
Modalidad: Revisión bibliográfica
Tutor/es: Francisco Javier Sanz Valero

ÍNDICE

1. RESUMEN
2. INTRODUCCIÓN
3. MATERIAL Y MÉTODO
4. RESULTADOS
5. DISCUSIÓN
6. BIBLIOGRAFÍA



1.RESUMEN

Objetivos: Revisar la literatura científica relacionada con las intervenciones desde la farmacia comunitaria en los pacientes adultos que recibieron atención de la salud a domicilio.

Métodos: Revisión exploratoria de los artículos recuperados de las bases de datos bibliográficas MEDLINE (PubMed), Embase, Cochrane Library, Scopus y Web of Science hasta marzo de 2020. La ecuación de búsqueda se formuló mediante los descriptores “*Home Care Services*” y “*Pharmacies*” o “*Community Pharmacy Services*”, utilizando también los *Entry Terms* relacionados y los filtros: «*Humans*» y «*Adult: 19+ years*». La calidad de los artículos se evaluó mediante el cuestionario STROBE.

Resultados: De las 307 referencias recuperadas, tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 44 artículos: 11 estudios descriptivos transversales y 10 ensayos aleatorizados controlados. En 19 (43%) de estos se observó que las intervenciones realizadas desde la farmacia comunitaria aumentaron la adherencia fármaco-terapéutica. También, un mejor conocimiento sobre los medicamentos (administración, seguridad, dosis, posología), en 17 (38,6%) trabajos y en 13 (29,5%) estudios se consiguió la prevención o resolución de los PRM. Al evaluar la calidad de los artículos seleccionados para la revisión mediante el cuestionario STROBE, las puntuaciones oscilaron entre un mínimo de 11 y un máximo de 20,8 sobre una puntuación máxima de 22.

Conclusiones: La intervención farmacéutica, a través de la farmacia comunitaria, aportó beneficios en la población más adulta, mediante el aumento de la adherencia farmacoterapéutica, la disminución de los problemas relacionados con los medicamentos y la mejora en el almacenamiento y conservación de los mismos.

Palabras clave:

Servicios de Atención de Salud a Domicilio; Farmacias; Servicios Comunitarios de Farmacia; Cumplimiento y Adherencia al Tratamiento; Errores de Medicación; Educación del Paciente como Asunto; Polifarmacia; Ancianos; Satisfacción del Paciente.

Intervencions des de la farmàcia comunitària en els pacients adults que reben atenció de la salut a domicili: revisió exploratòria.

RESUM

Objectius: Revisar la literatura científica relacionada amb les intervencions des de la farmàcia comunitària en els pacients adults que van rebre atenció de la salut a domicili.

Mètodes: Revisió exploratòria dels articles recuperats de les bases de dades bibliogràfiques MEDLINE (PubMed), Embase, Cochrane Library, Scopus i Web of Science fins a març de 2020. L'equació de recerca es va formular mitjançant els descriptors "Home Care Services" y "Farmàcies" o "Community Pharmacy Services", utilitzant també els Entry Terms relacionats i els filtres: «Humans» i «Adult: 19+ years». La qualitat dels articles es va avaluar mitjançant el qüestionari STROBE.

Resultats: De les 307 referències recuperades, després d'aplicar els criteris d'inclusió i exclusió, es van seleccionar 44 articles: 11 estudis descriptius transversals i 10 assaigs aleatoritzats controlats. En 19 (43%) d'aquests es va observar que les intervencions realitzades des de la farmàcia comunitària van augmentar l'adherència farmacoterapèutica. També, un millor coneixement sobre els medicaments (administració, seguretat, dosi, posologia) a 17 (38,6%) treballs i en 13 (29,5%) estudis es va aconseguir la prevenció o resolució dels PRM. A l'avaluar la qualitat dels articles seleccionats per a la revisió mitjançant el qüestionari STROBE, les puntuacions van oscil·lar entre un mínim de 11 i un màxim de 20,8 sobre una puntuació màxima de 22.

Conclusions: La intervenció farmacèutica, a través de la farmàcia comunitària, va aportar beneficis en la població més adulta, mitjançant l'augment de l'adherència farmacoterapèutica, la disminució dels problemes relacionats amb els medicaments i la millora en l'emmagatzematge i conservació dels mateixos.

Paraules clau:

Serveis d'Atenció de Salut a Domicili; Farmàcies; Serveis Comunitaris de Farmàcia; Compliment i Adherència a l'Tractament; Errors de Medicació; Educació de l'Pacient com Assumpte; polifarmàcia; ancians; Satisfacció de l'Pacient.

Community pharmacy interventions in adult patients receiving home health care: an exploratory review.

ABSTRACT

Objective: To review the scientific literature related to interventions from the community pharmacy in adult patients who received home health care.

Method: Exploratory review of the articles retrieved from the bibliographic databases MEDLINE (PubMed), Embase, Cochrane Library, Scopus and Web of Science until March 2020. The search equation was formulated using the descriptors "Home Care Services" and "Pharmacies" or "Community Pharmacy Services", also using the related Entry Terms and filters: "Humans" and "Adult: 19+ years". The quality of the articles was evaluated using the STROBE questionnaire.

Results: From the 307 references retrieved, after applying the inclusion and exclusion criteria, 44 articles were selected: 11 cross-sectional descriptive studies and 10 randomized controlled trials. In 19 (43%) of these, it was observed that the interventions carried out by the community pharmacy increased drug-therapeutic adherence. Also, a better knowledge of medications (administration, safety, dosage, dosage) in 17 (38.6%) studies and in 13 (29.5%) studies, the prevention or resolution of DRM was achieved. Once the articles were evaluated by means of the STROBE questionnaire for this review the scores ranged from a minimum of 11 to a maximum of 20.8 out of a maximum score of 22.

Conclusions: Pharmaceutical intervention, through community pharmacy, brought benefits in the older adult population, by increasing pharmacotherapeutic adherence, reducing drug-related problems, and challenges in preserving and storing medications.

Keywords:

Home Care Services; Pharmacies; Community Pharmacy Services; Treatment Adherence and Compliance; Medication Errors; Patient Education as Topic; Polypharmacy; Aged; Patient Satisfaction.



2. INTRODUCCIÓN

La hospitalización a domicilio (HaD) se definió como el servicio proporcionado, por profesionales sanitarios, que provee de tratamiento activo de la salud en el hogar del paciente, por una afección que de otro modo requeriría ingreso hospitalario (1). Por otra parte, el desarrollo de los servicios hospitalarios en el hogar tiene también como

objetivo mejorar la percepción del paciente respecto al tratamiento y mejorar su calidad de vida al ofrecer la posibilidad de dicha atención en un ambiente amigable y con la misma eficiencia en la atención (2). Así, la HaD se ha desarrollado y adaptado a este nuevo contexto siendo en estos momentos una alternativa real para el tratamiento en el domicilio de muchos pacientes con procesos médicos o quirúrgicos que no precisan de toda la estructura de una unidad de hospitalización (3).

En este contexto, la intervención del farmacéutico comunitario en el seguimiento de la medicación de los pacientes, e incluso su participación en los posibles programas de formación, tanto dirigidos a los enfermos como a sus cuidadores, pueden ser clave para mejorar el patrón de la HaD (4). Por ejemplo, la revisión y seguimiento de la medicación de los enfermos ingresados en HaD ofreció una plataforma de colaboración, entre los diferentes sanitarios, que influyó en la mejora y eficacia de los medicamentos utilizados. Costa *et al.* (5) demostraron que las acciones desde la farmacia comunitaria ayudaron a mejorar la seguridad del paciente, minimizaron los problemas relacionados con la medicación y animaron a los pacientes a desempeñar un papel activo en la gestión de su propia salud.

Kucukarslan *et al.* (6), demostraron que en aquellos pacientes ingresados en HaD, con bajo nivel de alfabetización en salud que fueron diagnosticados con una enfermedad crónica, se beneficiaron de un seguimiento personalizado e intensivo. Los farmacéuticos ayudaron en la toma de decisiones para la farmacoterapia óptima y realizaron un adecuado seguimiento de la medicación. Este estudio, observó que el farmacéutico comunitario apoyó la transferencia de la atención a la salud desde el hospital a la comunidad. Y, se comprobó el impacto de las intervenciones relacionadas con el seguimiento y adherencia a la medicación en la atención al paciente, mediante resultados medibles, principalmente en aquellos recién diagnosticados con una enfermedad crónica o que aún no habían logrado su objetivo terapéutico.

En la misma línea, Haynes *et al.* (7), demostraron la importancia de la participación del farmacéutico comunitario ya que, en los países desarrollados, la adherencia a la medicación de los enfermos crónicos en el domicilio era muy deficiente.

La atención farmacéutica domiciliaria es la respuesta profesional y responsable a un futuro marcado por el envejecimiento de la población, la cronicidad, la

dependencia y la necesidad de dar respuesta a la continuidad asistencial a estos pacientes.

En consecuencia, el objetivo de este trabajo fue revisar la literatura científica relacionada con las intervenciones desde la farmacia comunitaria en los pacientes adultos que recibieron atención de la salud a domicilio.



3. MATERIAL Y MÉTODO

Diseño

Estudio descriptivo transversal y análisis crítico de los trabajos recuperados mediante revisión sistemática.

Fuente de obtención de los datos

Los datos se obtuvieron de la consulta directa y acceso, vía Internet, a las siguientes bases de datos bibliográficas del ámbito de las ciencias de la salud: MEDLINE (vía PubMed), Embase, Cochrane Library, Scopus y Web of Science.

Tratamiento de la información

Para definir los términos de la búsqueda se consultó el *Thesaurus* desarrollado por la *U.S. National Library of Medicine*. Se consideró adecuado el uso de los términos “*Home Care Services*” y “*Pharmacies*” o “*Community Pharmacy Services*”, como descriptores y como texto en los campos de registro del título y el resumen, conformando la sintaxis de búsqueda final mediante la intersección booleana de dos ecuaciones: (Ecuación 1) AND (Ecuación 2).

– Ecuación 1 - Servicios de cuidado domiciliario:

“Home Care Services”[MeSH] OR “Home Care”[Title/Abstract] OR “Domiciliary Care”[Title/Abstract] OR “Home Care Services, Hospital-Based”[Mesh] OR “Hospital-Based Home Care”[All Fields] OR “Hospital Based Home Care”[Title/Abstract] OR “Hospital Home Care Services”[Title/Abstract] OR “Hospital-Based Home Care Services”[Title/Abstract] OR “Hospital Based Home Care Services”[Title/Abstract] OR “Home Hospitalization”[Title/Abstract] OR “Hospital at Home”[Title/Abstract] OR “Hospital-at-Home”[Title/Abstract] OR “Hospital Home Care”[Title/Abstract] OR “Hospital at Home Care”[Title/Abstract] OR “Hospital in the Home”[Title/Abstract]

– Ecuación 2 - Farmacia comunitaria - Tratamiento quimioterápico:

“Pharmacies”[Mesh] OR “Community Pharmacy”[Title/Abstract] OR “Community Pharmacies”[Title/Abstract] OR “Community Pharmacist”[Title/Abstract] OR “Community Pharmacy Services”[Mesh] OR “Community Pharmacy Service”[Title/Abstract] OR “Community Pharmaceutic Service”[Title/Abstract] OR “Community Pharmaceutical Service”[Title/Abstract]

La ecuación de búsqueda final se desarrolló para su empleo en la base de datos MEDLINE, vía PubMed, utilizando los filtros: «*Humans*» y «*Adult: 19+ years*».

Esta estrategia se adaptó a las características de cada una del resto de bases de datos consultadas. La búsqueda se realizó desde la primera fecha disponible, de acuerdo a las características de cada base de datos, hasta marzo de 2020 y

se completó con el examen del listado bibliográfico de los artículos que fueron seleccionados.

Selección final de los artículos

Se escogieron para la revisión y análisis crítico los artículos que cumplieron los siguientes criterios: adecuarse a los objetivos de la búsqueda (intervención desde la farmacia comunitaria), estar publicados en revistas arbitradas por pares y escritos en inglés, español o portugués.

La selección de los artículos pertinentes se realizó de forma independiente por los autores: JSM y JSV. Para dar por válida la inclusión de los estudios se estableció que la valoración de la concordancia entre estos autores (índice Kappa) debía ser superior al 60% (fuerza de la concordancia buena). Siempre que se cumpliera esta condición, las posibles discordancias se solucionaron mediante el consenso entre los autores (XX).

La calidad de los artículos seleccionados se valoró utilizando como apoyo las pautas para informar los estudios observacionales STROBE (*STrengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology*) (8), que contiene una lista de 22 puntos de control esenciales que deben describirse durante la publicación de estos documentos. Para cada artículo seleccionado, se asignó un punto por cada ítem presente (en caso de no ser aplicable, no puntuaba). Cuando un ítem estaba compuesto por varios puntos, estos se evaluaron de forma independiente, dándole el mismo valor a cada uno de ellos y posteriormente se realizó un promedio (siendo éste el resultado final de ese ítem), de tal forma que en ningún caso se pudiera superar la valoración total de un punto por ítem.

Para conocer el nivel de evidencia y su grado de recomendación se utilizaron las recomendaciones de la *U. S. Agency for Healthcare Research and Quality* (AHRQ) (9).

Extracción de los datos

El control de la corrección de los datos se realizó mediante dobles tablas que permitieron la detección de las desviaciones y su subsanación mediante nueva consulta de los originales.

Para determinar la actualidad de los artículos se calculó el semiperíodo de Burton-Kebler (la mediana de la edad) y el Índice de Price (porcentaje de artículo con edad inferior a los 5 años).

Los estudios se agruparon según las variables a estudio, con el fin de sistematizar y facilitar la comprensión de los resultados, considerando los siguientes datos: primer autor y año de publicación, diseño del estudio, población incluida en los artículos, país, periodo de implementación de la intervención y resultado principal obtenido en el estudio.

4. RESULTADOS

Al aplicar los criterios de búsqueda se recuperaron un total de 330 artículos: 30 (9,1%) en MEDLINE (vía PubMed), 61 (18,5%) en Embase, 3 (0,9%) en Cochrane Library, 125 (37,9%) en Scopus, 90 (27,3%) en Web of Science y 23 (7%) mediante búsqueda manual en los listados bibliográficos de los artículos seleccionados.

Tras depurar los 96 (29,1%) registros repetidos, aplicar los criterios de inclusión y exclusión, fue posible seleccionar 44 (13,3%) artículos (10–53), para su revisión y análisis crítico.

A la hora de revisar los artículos se observó que existían estudios que, si bien presentaron diferentes objetivos de estudio o poblaciones examinadas, los resultados relacionados con la intervención farmacéutica no diferían entre ellos y, por lo tanto, solo se aceptó el más actual para su revisión. Este fue el caso de Toivo *et al.* (13,54), Stafford *et al.* (33,55), Papastergiou *et al.* (11,56), Holland *et al.* (39,57–59), Roughead *et al.* (35,60) y Stewart *et al.* (51,61).

El acuerdo sobre la pertinencia de los estudios seleccionados, entre los dos evaluadores, calculado mediante el índice Kappa fue del 100%.

Los artículos elegidos presentaron una obsolescencia, según el Índice de Burton Kebler, igual a 8 años, con un Índice de Price del 27,3%. El año con mayor número de trabajos publicados fue el 2012, con 8 publicaciones (27–34).

Al evaluar la calidad de los artículos seleccionados para la revisión, mediante el cuestionario STROBE, las puntuaciones oscilaron entre mínimo de 11,0 (55% cumplimiento) y máximo de 20,8 (94,5% cumplimiento) con mediana igual a 14,3 (tabla 2).

Según los criterios de la *U. S. Agency for Healthcare Research and Quality* (AHRQ) esta revisión presentó evidencia Ib (procede de al menos un ensayo clínico aleatorizado) con grado de recomendación B (basada en estudios de las categorías Ib, IIa y IIb).

El diseño predominante en los 44 trabajos revisados fue en 11 de ellos descriptivo transversal (11,14,23,24,26,27,29,38,42,46,50) y en 10, de ensayo aleatorizado controlado (13,20,39,41,43–45,47,48,61).

La filiación mayoritaria de los trabajos incluidos en la revisión fue estadounidense, con 16 artículos (11,15–17,21,22,24–26,36,38,41,43,46,51,52), australiana con 10 artículos (18,23,30,31,33,35,42,44,45,47) y británica con 7 (14,39,40,48–50,53); el estudio de Fikri-Benbrahim *et al.* (32), presentó filiación española. Todos los trabajos aceptados en esta revisión estuvieron redactados en inglés.

La población incluida en los trabajos recopilados en esta revisión osciló entre un mínimo de 10 personas (22) y un máximo de 17136 (35), situándose el rango de la edad entre 49 y 88 años, excepto los estudios de Reidt *et al.* (25) y El Hajj *et al.* (28) que incluyeron una población entre los 18 y 65 años de edad. Se

comprobó que el trabajo de Clifton *et al.* (16) no se informaba sobre la separación, según sexo, de la población. Y, en los artículos de Fujita *et al.* (12), Elliott *et al.* (18), Triller *et al.* (46) y Nazaret *et al.* (48), no constaba ni la edad ni el sexo de la población a estudio.

En el estudio de Reidt *et al.* (25) se comprobó que en el grupo control se habían seleccionado 227 pacientes más que en el grupo intervención. Si bien, lo más destacado se pudo probar en el artículo de Roughead *et al.* (35) donde en el grupo de intervención se constató la existencia de 816 pacientes, mientras que en el grupo control habían 16.320.

Las patologías estudiadas más prevalentes fueron, en 17 estudios, las personas polimedicadas (14,18,19,21,25,29,30,34,36–40,42,44,49,52,53), en otros 7 fueron enfermos con patología cardiovascular o tratados con Warfarina (22,32,33,35,39,41,43) y otros 6 artículos estudiaron una población polimedicada crónica (11,15,16,46,47,51).

El periodo temporal que presentaron los estudios osciló entre los 2 y los 31 meses (27,35), variando el periodo de reclutamiento, también, entre los 2 meses y los 31 meses (12,29). El periodo de seguimiento fluctuó entre 1 mes (10,19,53) y 15 meses (18) y el de recopilación de los datos varió de 5 a 7 meses (15,23). Los artículos de Sorensen *et al.* (42) y de Raynor *et al.* (49) no indicaron ningún periodo.

Intervenciones realizadas desde la farmacia comunitaria

Las intervenciones más frecuentes en los documentos revisados fueron la revisión de la medicación a domicilio, en 22 de ellos (11,12,15–17,20,23,24,26,29–31,35,37,38,40,42,44,46,49,52,53). En 20 artículos la acción realizada consistió en la educación sobre el correcto uso y seguridad de los medicamentos (10,13,17,18,24,32,34,35,37,39,41–43,45–48, 51–53) y en 18 se identificaron los problemas relacionados con la medicación (PRM) (11,13–15,19,21,24–26,30,31,35,36,47,49–52). Hubo 13 trabajos en los que la intervención realizada por el farmacéutico comunitario fue la identificación de problemas como la falta de adherencia al tratamiento (15,22,24,34,41–43,45,47–49,51,53).

Otras intervenciones realizadas, en los estudios revisados, fueron la impartición de consejos o recomendaciones por parte del farmacéutico, en 6 ocasiones, (13,21,30,41,43, 46), la realización de pruebas diagnósticas a domicilio, en 5 casos, (28,31,33,43,44) y otras 4 intervenciones, fueron las recomendaciones sobre la conservación y almacenaje de medicamentos o botiquines (11,27,42,52).


Resultados observados en los pacientes que recibieron la atención de la salud a domicilio

Entre las consecuencias derivadas de las intervenciones realizadas desde la farmacia comunitaria destacó el aumento de la adherencia fármaco-terapéutica, observada en 19 artículos (10,11,14,17,19–22,27,29,32–34,42,44,46,47,52,53).

También, se pudo probar un mejor conocimiento sobre los medicamentos (administración, seguridad, dosis, posología), en 17 trabajos (11,12,15,17,20,29,30,32,34-38,40,49,50,53). Asimismo, en 13 estudios se consiguió la prevención o la resolución de los PRM (10,12,19,21,24-26,30,31,44,46,47,49) e, igualmente, se logró una mejora en la atención farmacéutica, haciendo que los pacientes aceptaran las recomendaciones hechas desde la farmacia comunitaria, en 9 ocasiones, (15,17,18,23,35,36,43,47,50). Además, en 7 trabajos revisados se observó un mejor uso de los medicamentos tras la intervención farmacéutica (20,24,27,31,37,50,52) e incluso, en 6 artículos, se consiguió una mejoría de síntomas y de resultados de la salud (10,16,24,43-45).

Otros resultados, relacionados con la intervención desde la farmacia comunitaria fueron: el ahorro de costes que supuso la atención farmacéutica a domicilio, en 5 artículos (14,16,21,36,44). La reducción de los ingresos hospitalarios, en 5 trabajos (21,22,36,47,51) y, en contraposición, 5 artículos informaron que no había dicha reducción y, en ocasiones, incluso se observó un aumento en los ingresos hospitalarios (25,35,39,41,51).

Por último, mencionar también, que 2 estudios observaron una sustancial mejora en el almacenaje de los medicamentos y botiquines (27,52).



5. DISCUSIÓN

De los resultados obtenidos en la revisión de los diferentes artículos se pudo comprobar la existencia de investigaciones que destacaban ventajas resultantes de las intervenciones desde la farmacia comunitaria en los pacientes adultos que recibieron atención de la salud a domicilio.

El análisis de la actualidad/obsolescencia de los estudios incluidos demostró la plena

vigencia del tema estudiado ya que los datos calculados mostraron menor obsolescencia que los datos usuales en el ámbito de los estudios sobre hospitalización domiciliaria (62).

La evaluación de la calidad de los estudios incluidos en este trabajo mediante STROBE no resultó muy elevada, aunque similar a la observada en otras revisiones similares (63,64). De todos modos, no se eliminó ningún estudio para no limitar información a los posibles lectores de esta revisión.

El diseño de los estudios revisados mostró una adecuada evidencia las recomendaciones de la *U. S. Agency for Healthcare Research and Quality* (AHRQ). El optar por el diseño observacional se debió a la búsqueda de una consistente relación causa–efecto, ya que se buscaban trabajos de intervención (9). En consecuencia, se encontró un predominio de los trabajos con diseño descriptivo transversal, aunque también se revisó un buen número de ensayos clínicos.

Era predecible la filiación anglófona de una mayoría de artículos y que estuvieran redactados, principalmente, en lengua inglesa, este idioma es el elegido para la publicación de la mayoría de los artículos ya que hacerlo en otra lengua distinta resulta negativo para la visibilidad. Asimismo, el número de revistas anglófonas contenidas en las principales bases de datos bibliográficas es muy elevado y publicar en ellas facilita la citación (63,65).

La población incluida en los estudios presentó edades avanzadas. Esta situación es común en las unidades de HaD ya que para grupos de población adulta o anciana con patologías crónicas o terminales la HaD encuentra todo su significado y ha demostrado ser un modelo eficiente. El desarrollo de esquemas de hospitalización domiciliaria integral es una oportunidad como alternativa a la hospitalización convencional adaptada a pacientes ancianos en nuestro entorno asistencial (63,66). En cuanto al período de seguimiento resultó adecuado para valorar los resultados de la intervención, requisito que cumplieron la mayoría de los estudios seleccionados. Se considera necesario un periodo de varias semanas para poder valorar los resultados (64).

Las patologías estudiadas más prevalentes fueron las personas polimedizadas, hecho que está en consonancia con el objetivo del estudio y que la principal población ingresada en HaD sea adulta o anciana con patologías crónicas (66,67).

La revisión de la medicación efectuada desde la farmacia comunitaria motivó un mejor conocimiento del plan farmacoterapéutico y de la medicación. En este sentido, el seguimiento farmacoterapéutico presenta dos connotaciones claras: es un servicio esencial que se debe prestar al paciente y supone una responsabilidad con la que el farmacéutico ha de cumplir (68). Este servicio profesional aborda, de manera global, los problemas de salud y los medicamentos que utiliza el paciente, centrándose en la valoración de la necesidad, efectividad y seguridad de la farmacoterapia.

Talbreza & McPherson (69), en su trabajo “reconocimiento y gestión de la polifarmacia en enfermedades avanzadas”, concluyeron que los adultos mayores, la mayoría de los pacientes incluidos en los estudios revisados, corrían un mayor riesgo de PRM al soportar una gran carga de polifarmacia y, en consecuencia, los profesionales que atienden a esta población vulnerable debían de utilizar habilidades de comunicación para intervenir en estas personas y sus familias con el fin de mejorar su medicación y evitar los PRM. Anderson *et al.* (70), en una reciente revisión sistemática, observaron que esta intervención farmacéutica tenía un impacto medible en beneficio de las personas a las que se controlaba su medicación.

Esta intervención farmacoterapéutica, para la identificación de los PRM, necesita de la aplicación de medidas y estrategias que permitan corregir esta situación, como: estrategias técnicas, educativas, conductuales, tratamiento de observación directa, técnicas de apoyo social, técnicas dirigidas a profesionales y recuerdo de las estrategias (71).

Por otro lado, la falta de adherencia al tratamiento farmacológico es un problema relacionado con el proceso de uso de los medicamentos que puede dar lugar, si no se soluciona, a resultados negativos asociados a la medicación. Como se ha probado en esta revisión, la intervención desde la farmacia comunitaria puede evitar que las personas abandonen sus tratamientos. Las estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico van a procurar que haya coincidencia entre las instrucciones dadas por el profesional sanitario respecto a la medicación y la realización de éstas por parte del paciente (72).

Pero, como también se ha podido comprobar, se apreció un mejor uso de los medicamentos tras la intervención farmacéutica. Es fundamental que las intervenciones incluyan elementos educativos, que impliquen no solo una adecuada comunicación, sino también una atención especial a la motivación, que debe ser más intensa si se pretende mantener en el tiempo el nuevo hábito. Una vez consolidada esta actitud, habrá que hacer hincapié en medidas de soporte que refuercen la base cognoscitiva y conceptual ya lograda (71).

Un importante beneficio a la hora de la educación de los pacientes, según Catania (73), es que el farmacéutico comunitario es el profesional de la salud más confiable. Debido a esta confianza los pacientes respondían, en su mayoría, positivamente a los consejos y la formación brindada por los farmacéuticos.

Estos profesionales pueden colaborar con otros sanitarios de atención domiciliaria para coordinar la atención y garantizar la continuidad farmacoterapéutica.

Otra de las intervenciones observadas coincidió con Pellegrin *et al.* (74), donde confirmó que estas acciones reducían la tasa de hospitalización relacionada con la medicación para adultos mayores y producían un ahorro en la medicación. En el entorno domiciliario, la educación del paciente y del cuidador en el manejo de la medicación y la intervención de la farmacia comunitaria en el monitoreo de pacientes puede ser clave para mejorar la adherencia farmacoterapéutica (4).

Posibles limitaciones de esta revisión: Una importante limitación de la presente revisión fue no poder recuperar el texto completo de algunos artículos, siendo los principales motivos no estar digitalizados en la web de la revista, no aparecer en las principales colecciones de revistas e incluso no poder ser recuperado a través de la red de bibliotecas universitarias. Con respecto a los resultados de las intervenciones observadas, hubiera sido interesante resumirlas en un valor cuantitativo o haber dado una medida de tendencia central. Sin embargo, no fue posible al no encontrar datos cuantitativos en la mayoría de los artículos revisados y a la gran heterogeneidad los mismos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se pudo concluir que la intervención farmacéutica, a través de la farmacia comunitaria, aportó beneficios en la población más adulta, mediante el aumento de la adherencia farmacoterapéutica, la disminución de los problemas relacionados con los medicamentos y la mejora en el almacenamiento y conservación de los mismos.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. Cool L, Missiaen J, Vandijck D, Lefebvre T, Lycke M, De Jonghe PJ, et al. An observational pilot study to evaluate the feasibility and quality of oncological home-hospitalization. *Eur J Oncol Nurs*. 2019;40:44-52.
2. Raphaël R, Yves D, Giselle C, Magali M, Odile CM. Cancer treatment at home or in the hospital: what are the costs for French public health insurance? Findings of a comprehensive-cancer centre. *Health Policy*. 2005;72(2):141-8.
3. Diaz Gegundez M, Gomez de Argila I, Ferrer Cobo E, Castelar Delgado E. 10 años de hospitalización a domicilio en el entorno de un hospital comarcal. *Hosp Domic*. 2020;4(2):19-30.
4. Gea Cabrera A, Sanz-Lorente M, Sanz-Valero J, López-Pintor E. Compliance and Adherence to Enteral Nutrition Treatment in Adults: A Systematic Review. *Nutrients*. 2019;11(11).
5. Costa D, Van C, Abbott P, Krass I. Investigating general practitioner engagement with pharmacists in Home Medicines Review. *J Interprof Care*. 2015;29(5):469-75.
6. Kucukarslan SN, Hagan AM, Shimp LA, Gaither CA, Lewis NJW. Integrating medication therapy management in the primary care medical home: A review of randomized controlled trials. *Am J Health Syst Pharm*. 2011;68(4):335-45.
7. Haynes RB, McDonald H, Garg AX, Montague P. Interventions for helping patients to follow prescriptions for medications. *Cochrane Database Syst Rev*. 2002;(2):CD000011.
8. von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. Declaración de la Iniciativa STROBE (Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology): directrices para la comunicación de estudios observacionales. *Gac Sanit*. 2008;22(2):144-50.
9. Berkman ND, Lohr KN, Ansari M, McDonagh M, Balk E, Whitlock E, et al. Grading the Strength of a Body of Evidence When Assessing Health Care Interventions for the Effective Health Care Program of the Agency for Healthcare Research and Quality: An Update. En: *Methods Guide for Effectiveness and Comparative Effectiveness Reviews* [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2008 [citado 3 de abril de 2020]. (AHRQ Methods for Effective Health Care). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK174881/>

10. Daliri S, Hugtenburg JG, Ter Riet G, van den Bemt B, Buurman BM, Scholte Op Reimer WJM, et al. The effect of a pharmacy-led transitional care program on medication-related problems post-discharge: A before-After prospective study. *PLoS ONE*. 2019;14(3):e0213593.
11. Papastergiou J, Luen M, Tencaliuc S, Li W, van den Bemt B, Houle S. Medication management issues identified during home medication reviews for ambulatory community pharmacy patients. *Can Pharm J (Ott)*. 2019;152(5):334-42.
12. Fujita K, Kushida K, Moles RJ, Chen TF. Home healthcare professionals' perspectives on quality dimensions for home pharmaceutical care in Japan. *Geriatr Gerontol Int*. 2019;19(1):35-43.
13. Toivo T, Airaksinen M, Dimitrow M, Savela E, Pelkonen K, Kiuru V, et al. Enhanced coordination of care to reduce medication risks in older home care clients in primary care: a randomized controlled trial. *BMC Geriatr*. 2019;19(1):332.
14. Kayyali R, Funnell G, Harrap N, Patel A. Can community pharmacy successfully bridge the gap in care for housebound patients? *Res Social Adm Pharm*. 2019;15(4):425-39.
15. Corsi K, Lemay V, Orr KK, Cohen L. Pharmacist medication therapy management in home health care: Investigation of a sustainable practice model. *J Am Pharm Assoc*. 2018;58(4S):S64-8.
16. Clifton CL, Branham AR, Hayes HH, Moose JS, Rhodes LA, Marciniak MW. Financial impact of patients enrolled in a medication adherence program at an independent community pharmacy. *J Am Pharm Assoc*. 2018;58(4S):S109-13.
17. Walus AN, Woloschuk DMM. Impact of Pharmacists in a Community-Based Home Care Service: A Pilot Program. *Can J Hosp Pharm*. 2017;70(6):435-42.
18. Elliott RA, Lee CY, Beanland C, Goeman DP, Petrie N, Petrie B, et al. Development of a clinical pharmacy model within an Australian home nursing service using co-creation and participatory action research: the Visiting Pharmacist (ViP) study. *BMJ Open*. 2017;7(11):e018722.
19. Ong KY, Cheen MHH, Chng JSG, Chen LL, Ng SM, Lim SH, et al. Effectiveness of a multidisciplinary home-based medication review program in reducing healthcare utilization among older adult Singaporeans: Home-

- based medication reviews for the elderly. *Geriatr Gerontol Int.* 2017;17(2):302-7.
20. Basheti IA, Al-Qudah RA, Obeidat NM, Bulatova NR. Home medication management review in outpatients with chronic diseases in Jordan: a randomized control trial. *Int J Clin Pharm.* 2016;38(2):404-13.
 21. Steele KM, Ruisinger JF, Bates J, Prohaska ES, Melton BL, Hipp S. Home-Based Comprehensive Medication Reviews: Pharmacist's Impact on Drug Therapy Problems in Geriatric Patients. *Consult Pharm.* 2016;31(10):598-605.
 22. Kalista T, Lemay V, Cohen L. Postdischarge community pharmacist-provided home services for patients after hospitalization for heart failure. *J Am Pharm Assoc.* 2015;55(4):438-42.
 23. Carter SR, Moles R, White L, Chen TF. The impact of patients' perceptions of the listening skills of the pharmacist on their willingness to re-use Home Medicines Reviews: A structural equation model. *Res Social Adm Pharm.* 2015;11(2):163-75.
 24. Pherson EC, Shermock KM, Efird LE, Gilmore VT, Nesbit T, LeBlanc Y, et al. Development and implementation of a postdischarge home-based medication management service. *Am J Health Syst Pharm.* 2014;71(18):1576-83.
 25. Reidt SL, Larson TA, Hadsall RS, Uden DL, Blade MA, Branstad R. Integrating a pharmacist into a home healthcare agency care model: impact on hospitalizations and emergency visits. *Home Healthc Nurse.* 2014;32(3):146-52.
 26. Kogut SJ, Goldstein E, Charbonneau C, Jackson A, Patry G. Improving medication management after a hospitalization with pharmacist home visits and electronic personal health records: an observational study. *Drug Healthc Patient Saf.* 2014;6:1-6.
 27. Kalyango JN, Hall M, Karamagi C. Home medication management practices and associated factors among patients with selected chronic diseases in a community pharmacy in Uganda. *BMC Health Serv Res.* 2012;12:323.
 28. El Hajj MS, El-Ajez RH, Al-Ismail MSM, Sawaftah DM. Home diagnostic tests in the state of Qatar: a snapshot of public views, level of awareness and use. *Int J Clin Pharm.* 2012;34(6):885-92.

29. Kwint HF, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML. The contribution of patient interviews to the identification of drug-related problems in home medication review. *J Clin Pharm Ther.* 2012;37(6):674-80.
30. Lee CY, George J, Elliott RA, Stewart K. Exploring stakeholder perspectives on medication review services for older residents in retirement villages. *Int J Pharm Pract.* 2012;20(4):249-58.
31. Elliott RA, Martinac G, Campbell S, Thorn J, Woodward MC. Pharmacist-led medication review to identify medication-related problems in older people referred to an Aged Care Assessment Team: a randomized comparative study. *Drugs Aging.* 2012;29(7):593-605.
32. Fikri-Benbrahim N, Faus MJ, Martínez-Martínez F, Alsina DG-S, Sabater-Hernández D. Effect of a pharmacist intervention in Spanish community pharmacies on blood pressure control in hypertensive patients. *Am J Health Syst Pharm.* 2012;69(15):1311-8.
33. Stafford L, van Tienen EC, Bereznicki LRE, Peterson GM. The benefits of pharmacist-delivered warfarin education in the home. *Int J Pharm Pract.* 2012;20(6):384-9.
34. Sheridan J, Butler R, Brandt T, Harrison J, Jensen M, Shaw J. Patients' and pharmacists' perceptions of a pilot Medicines Use Review service in Auckland, New Zealand: Medicines Use Review pilot in New Zealand. *J Pharm Health Serv Res.* 2012;3(1):35-40.
35. Roughead EE, Barratt JD, Ramsay E, Pratt N, Ryan P, Peck R, et al. Collaborative home medicines review delays time to next hospitalization for warfarin associated bleeding in Australian war veterans. *J Clin Pharm Ther.* 2011;36(1):27-32.
36. Flanagan P, Virani A, Baker W, Roelants H. Pharmacists making house calls: innovative role or overkill? *Can J Hosp Pharm.* 2010;63(6):412-9.
37. Hugtenburg JG, Borgsteede SD, Beckeringh JJ. Medication review and patient counselling at discharge from the hospital by community pharmacists. *Pharm World Sci.* 2009;31(6):630-7.
38. Moultry AM, Poon IO. Perceived value of a home-based medication therapy management program for the elderly. *Consult Pharm.* 2008;23(11):877-85.

39. Holland R, Brooksby I, Lenaghan E, Ashton K, Hay L, Smith R, et al. Effectiveness of visits from community pharmacists for patients with heart failure: HeartMed randomised controlled trial. *BMJ*. 2007;334(7603):1098.
40. Salter C, Holland R, Harvey I, Henwood K. «I haven't even phoned my doctor yet.» The advice giving role of the pharmacist during consultations for medication review with patients aged 80 or more: qualitative discourse analysis. *BMJ*. 2007;334(7603):1101.
41. Triller DM, Hamilton RA. Effect of pharmaceutical care services on outcomes for home care patients with heart failure. *Am J Health Syst Pharm*. 2007;64(21):2244-9.
42. Sorensen L, Stokes JA, Purdie DM, Woodward M, Roberts MS. Medication management at home: medication risk factor prevalence and inter-relationships. *J Clin Pharm Ther*. 2006;31(5):485-91.
43. Zillich AJ, Sutherland JM, Kumbera PA, Carter BL. Hypertension outcomes through blood pressure monitoring and evaluation by pharmacists (HOME study). *J Gen Intern Med*. 2005;20(12):1091-6.
44. Sorensen L, Stokes JA, Purdie DM, Woodward M, Elliott R, Roberts MS. Medication reviews in the community: results of a randomized, controlled effectiveness trial. *Br J Clin Pharmacol*. 2004;58(6):648-64.
45. Peterson GM, Fitzmaurice KD, Naunton M, Vial JH, Stewart K, Krum H. Impact of pharmacist-conducted home visits on the outcomes of lipid-lowering drug therapy. *J Clin Pharm Ther*. 2004;29(1):23-30.
46. Triller DM, Clause SL, Briceland LL, Hamilton RA. Resolution of drug-related problems in home care patients through a pharmacy referral service. *Am J Health Syst Pharm*. 2003;60(9):905-10.
47. Naunton M, Peterson GM. Evaluation of Home-Based Follow-Up of High-Risk Elderly Patients Discharged from Hospital. *J Pharm Pract Res*. 2003;33(3):176-82.
48. Nazareth I, Burton A, Shulman S, Smith P, Haines A, Timberal H. A pharmacy discharge plan for hospitalized elderly patients--a randomized controlled trial. *Age Ageing*. 2001;30(1):33-40.
49. Raynor DK, Nicolson M, Nunney J, Petty D, Vail A, Davies L. The development and evaluation of an extended adherence support programme

- by community pharmacists for elderly patients at home. *Int J Pharm Pract.* 2000;8(3):157-64.
50. Read RW, Krska J. Targeted medication review: patients in the community with chronic pain. *Int J Pharm Pract.* 1998;6(4):216-22.
 51. Stewart S, Pearson S, Luke CG, Horowitz JD. Effects of home-based intervention on unplanned readmissions and out-of-hospital deaths. *J Am Geriatr Soc.* 1998;46(2):174-80.
 52. Hsia Der E, Rubenstein LZ, Choy GS. The benefits of in-home pharmacy evaluation for older persons. *J Am Geriatr Soc.* 1997;45(2):211-4.
 53. Begley S, Livingstone C, Hodges N, Williamson V. Impact of domiciliary pharmacy visits on medication management in an elderly population. *Int J Pharm Pract.* 1997;5(3):111-21.
 54. Toivo T, Dimitrow M, Puustinen J, Savela E, Pelkonen K, Kiuru V, et al. Coordinating resources for prospective medication risk management of older home care clients in primary care: procedure development and RCT study design for demonstrating its effectiveness. *BMC Geriatr.* 2018;18(1):74.
 55. Stafford L, Peterson GM, Bereznicki LRE, Jackson SL, van Tienen EC, Angley MT, et al. Clinical outcomes of a collaborative, home-based postdischarge warfarin management service. *Ann Pharmacother.* 2011;45(3):325-34.
 56. Papastergiou J, Zervas J, Li W, Rajan A. Home medication reviews by community pharmacists: Reaching out to homebound patients. *Can Pharm J (Ott).* 2013;146(3):139-42.
 57. Lenaghan E, Holland R, Brooks A. Home-based medication review in a high risk elderly population in primary care--the POLYMED randomised controlled trial. *Age Ageing.* 2007;36(3):292-7.
 58. Holland R, Lenaghan E, Harvey I, Smith R, Shepstone L, Lipp A, et al. Does home based medication review keep older people out of hospital? The HOMER randomised controlled trial. *BMJ.* 2005;330(7486):293.
 59. Holland R, Lenaghan E, Smith R, Lipp A, Christou M, Evans D, et al. Delivering a home-based medication review, process measures from the HOMER randomised controlled trial. *Int J Pharm Pract.* 2006;14(1):71-9.
 60. Roughead EE, Barratt JD, Ramsay E, Pratt N, Ryan P, Peck R, et al. The effectiveness of collaborative medicine reviews in delaying time to next

- hospitalization for patients with heart failure in the practice setting: results of a cohort study. *Circ Heart Fail.* 2009;2(5):424-8.
61. Stewart S, Pearson S, Horowitz JD. Effects of a home-based intervention among patients with congestive heart failure discharged from acute hospital care. *Arch Intern Med.* 1998;158(10):1067-72.
 62. Sanz-Valero J, Wanden-Berghe C. Análisis bibliométrico de la producción científica, indizada en MEDLINE, sobre los servicios de salud proporcionados por las unidades de hospitalización a domicilio. *Hosp Domic.* 2017;1(1):21-34.
 63. Álvarez Velásquez S, Sanz Valero J. Ventajas de la quimioterapia domiciliaria en los enfermos adultos con neoplasias: revisión sistemática. *Hosp Domic.* 2020;4(1):25-41.
 64. Aracil-Lavado E, Wanden-Berghe C, Sanz-Valero J. Evaluación de la calidad de vida según el estado nutricional del paciente paliativo adulto: revisión sistemática. *Hosp Domic.* 2017;1(4):199-210.
 65. Campos Cañuelo D, Sanz-Valero J, Wanden-Berghe C. Consecuencias de la nutrición parenteral domiciliaria en adultos con síndrome de intestino corto: revisión exploratoria. *Hosp Domic.* 2019;3(2):149-62.
 66. Mas MÀ, Santa Eugènia S. Hospitalización domiciliaria en el paciente anciano: revisión de la evidencia y oportunidades de la geriatría. *Revista Española de Geriatría y Gerontología.* 2015;50(1):26-34.
 67. Estrada Cuxart O, Massa Domínguez B, Ponce González MÁ, Mirón Rubio M, Torres Corts A, Mujal Martínez A, et al. Proyecto HAD 2020: una propuesta para consolidar la hospitalización a domicilio en España. *Hosp Domic.* 2017;1(2):93-117.
 68. Sabater Hernández D, Silva Castro MM, Faus Dáder MJ. Método Dáder: Guía de Seguimiento Farmacoterapéutico. 3ª edición. Granada, España: Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica, Universidad de Granada; 2007.
 69. Talebreza S, McPherson ML. Recognizing and Managing Polypharmacy in Advanced Illness. *Med Clin North Am.* 2020;104(3):405-13.
 70. Anderson LJ, Schnipper JL, Nuckols TK, Shane R, Le MM, Robbins K, et al. Effect of medication reconciliation interventions on outcomes: A

- systematic overview of systematic reviews. *Am J Health Syst Pharm.* 2019;76(24):2028-40.
71. Rodríguez Chamorro MA, Pérez Merino EM, García Jiménez E, Rodríguez Chamorro A, Martínez Martínez F, Faus Dader MJ. Revisión de estrategias utilizadas para la mejora de la adherencia al tratamiento farmacológico. *Pharm Care Esp.* 2014;16(3):110-20.
72. Rodríguez Chamorro MÁ, García-Jiménez E, Amariles P, Rodríguez Chamorro A, Pérez Merino EM, Martínez Martínez F, et al. Efecto de la actuación farmacéutica en la adherencia del tratamiento farmacológico de pacientes ambulatorios con riesgo cardiovascular (Estudio EMDADER-CV-INCUMPLIMIENTO). *Atención Primaria.* 2011;43(5):245-53.
73. Catania PN. What is the role of the pharmacist in home care? *Home Care Provid.* 1997;2(5):229-31.
74. Pellegrin KL, Krenk L, Oakes SJ, Ciarleglio A, Lynn J, McInnis T, et al. Reductions in Medication-Related Hospitalizations in Older Adults with Medication Management by Hospital and Community Pharmacists: A Quasi-Experimental Study. *J Am Geriatr Soc.* 2017;65(1):212-9.



Figura 1 – Identificación y selección de estudios




Tabla 1. Resumen de los estudios revisados sobre intervenciones desde la farmacia comunitaria en los pacientes adultos que reciben atención de la salud a domicilio.

Autor, año	Diseño	Población estudiada	Patología	País	Periodo del estudio	Tipo de intervención	Resultado observado
Daliri <i>et al.</i> 2019 (10)	Estudio prospectivo multicéntrico	N= 456 GI: n= 222 H/M= 124/98 Edad= 70,2 ± 12,8 GC: n= 234 H/M= 130/104 Edad= 70,8 ± 11,9	Pacientes ingresados en el hospital con medicación crónica	Países Bajos	Periodo total: 01/2016 al 11/2016 Periodo de reclutamiento: 01/2016 al 06/2016 Periodo de seguimiento: 4 semanas	Se enseñó a los pacientes el correcto uso del medicamento con una atención de seguimiento post-hospitalización en el hogar.	Los pacientes tienen menos síntomas, recuerdan más la medicación y su continuidad (mejor adherencia). Los farmacéuticos identifican, resuelven y previenen PRM.
Papastergiou <i>et al.</i> 2019 (11)	Estudio descriptivo transversal	N= 100 H/M= 42/58 Edad=76,9	Polimedicados crónicos	EE. UU.	Periodo de reclutamiento: 01/2016 al 03/2017	Se hizo una revisión de medicamentos, se identificaron PRM reales y potenciales, se recomendó un uso y unas prácticas de organización/ almacenamiento de estos en el hogar.	Se resolvió la falta de información sobre el propósito y administración de sus medicamentos, se mejoró el correcto uso del glucómetro, inhaladores y tensiómetros. Hubo un aumento de adherencia, seguridad y eficacia de los medicamentos.
Fujita <i>et al.</i> 2019 (12)	Grupos focales	N= 24 H/M= No consta Edad= No consta	Ancianos con poca movilidad	Japón	Periodo de reclutamiento: 12/2016 al 01/2017	Se dio un suministro de medicamentos y una revisión de estos a domicilio.	La formación impartida facilitó el conocimiento de su tratamiento y la reducción de los PRM.

Toivo <i>et al.</i> 2019 (13)	Ensayo aleatorio controlado	N= 129 GI: n= 65 H/M= 21/44 Edad= 81,6 ± 7,1 GC: n= 64 H/M= 18/46 Edad= 84,0 ± 6,8	Ancianos	Finlandia	Periodo total: 09/2015 al 12/2016 Periodo de reclutamiento: 09/2015 al 12/2015 Periodo de seguimiento: 12 meses	Los farmacéuticos a domicilio informaron sobre el correcto uso de los medicamentos, hicieron una reconciliación de estos, identificaron PRM e hicieron recomendaciones para resolverlos.	Tras la revisión exhaustiva de la medicación y un seguimiento adecuado, se hizo un ajuste de los tratamientos y de las pruebas clínica asociadas.
Kayyali <i>et al.</i> 2019 (14)	Estudio descriptivo transversal	N = 133 H/M= 39/ 82 12 sin información Edad = 83	Ancianos polimedicados en sus domicilios	Reino Unido	Periodo de seguimiento: 05/2015 al 01/2016	Revisión de medicación a domicilio, se identificaron PRM, problemas de adherencia monitorización y un control general de la situación.	La intervención mejoró en la ayuda a los mayores tanto en la medicación como en la atención sanitaria.
Corsi <i>et al.</i> 2018 (15)	Programa piloto prospectivo	N = 25 H/M = 12/ 13 Edad= 79,88 ± 8,08	Ancianos polimedicados crónicos	EE. UU.	Periodo de recopilación de datos: 01/2017 al 05/2017	Hubo una gestión de medicamentos para identificar pacientes comórbidos, polimedicados, PRM y se creó un plan de acción de medicación en el hogar.	Se logró un ahorro de costes, reducción PRM y mejor control por parte de los pacientes de su medicación.
Clifton <i>et al.</i> 2018 (16)	Análisis retrospectivo	N= 341 H/M= No consta Edad= 62,4	Polimedicados crónicos	EE. UU.	Periodo de reclutamiento: 09/2014 al 12/2016 Periodo de seguimiento: 12 meses	Se mejoraron los servicios farmacéuticos con visitas domiciliarias y revisiones de la medicación.	Se consiguió una reducción de gastos y mejoras en los resultados de la salud.

Walus <i>et al.</i> 2017 (17)	Estudio piloto	N= 122 H/M= 45/77 Edad= 71	Desorden cardiovascular, trastorno de salud mental, desorden endocrino y alergias.	EE. UU.	Periodo total: 05/2015 al 07/2016	Prestación de servicios de farmacia a domicilio (revisión de medicamentos y educación a los pacientes sobre el medicamento)	Se mejoro la educación para el paciente y se aumentó la adherencia. Hubo una necesidad de mejorar los servicios de farmacia a domicilio porque los pacientes preferían las consultas telefónicas
Elliott <i>et al.</i> 2017 (18)	Estudio teórico de co-creación y acción participativa	N= 1089 H/M= No consta Edad= No consta	Pacientes con riesgos RAM, polimedicados y ancianos.	Australia	Periodo total: 09/2014 al 11/2015 Periodo de seguimiento: 15 meses	Se creó un modelo colaborativo entre un servicio de enfermería y un farmacéutico a domicilio, para mejorar el manejo del medicamento y su seguridad.	La mejora del asesoramiento redujo los RAM.
Ong <i>et al.</i> 2017 (19)	Estudio observacion al retrospectivo	N= 107 H/M= 52/55 Edad= 75,6 ± 7,6	Polimedicados	Singapur	Periodo de reclutamiento: 03/2011 al 12/2012 Periodo de seguimiento: 1 mes	Asesoramiento farmacológico, identificación de PRM y recomendaciones en el hogar,	Reducción del riesgo de ingreso hospitalario y reducción del coste. Se resolvieron los PRM y se mejoró la adherencia.
Basheti <i>et al.</i> 2016 (20)	Ensayo aleatorio controlado	N= 97 GI: n= 48 H/M= 17/31 Edad= 63,13 ± 7,99 GC: n= 49 H/M= 12/37 Edad= 58,39 ± 12,8	Enfermedades crónicas	Jordania	Periodo total: 06/2014 al 12/2014 Periodo de seguimiento: 3 meses	Identificación, en el hogar, de PRM, tipo y frecuencia, además de su resolución por el farmacéutico en conjunto con el médico.	Hubo una reducción de PRM y una mejor adherencia al medicamento

Steele <i>et al.</i> 2016 (21)	Estudio de pre y post-intervención	N= 25 H/M= 7/18 Edad= 88	Ancianos geriátricos con polimedición	EE. UU.	Periodo de reclutamiento: 09/2014 al 01/2015	Se evaluó los efectos de las revisiones integrales de medicamentos a domicilio.	Se mejoró la adherencia y administración de medicamentos y se redujeron las técnicas incorrectas con respecto a ellos.
Kalista <i>et al.</i> 2015 (22)	Proyecto piloto prospectivo	N= 10 H/M= 4/6 Edad= 81,3 ± 7,3	Insuficiencia cardiaca	EE. UU.	Periodo de reclutamiento: 12/2013 al 04/2014 Periodo de seguimiento: 5 semanas	Atención domiciliaria para mejorar la adherencia.	Se mejoró la adherencia y se redujo las tasas de reingresos en el hospital.
Carter <i>et al.</i> 2015 (23)	Estudio descriptivo transversal	N= 595 H/M= 298/297 Edad= 65	Pacientes que han experimentado una revisión de los medicamentos en el hogar	Australia	Periodo de recopilación de datos: 11/2008 al 05/2009	Cuestionario para evaluar la capacidad de escucha, de comunicación y de la efectividad de la revisión de medicamentos a domicilio.	Los farmacéuticos tienen una buena habilidad para escuchar y una eficacia en la comunicación.
Pherson <i>et al.</i> 2014 (24)	Estudio descriptivo transversal	N= 50 H/M= 23/27 Edad= 60 ± 12,6	Ingresados con alta medica	EE. UU.	Periodo de reclutamiento: 02/2012 al 09/2013	Se ofreció un servicio de gestión de medicamento a domicilio para educar sobre el correcto uso de medicamentos, para mejorar la adherencia y para evaluar y crear conciencia de PRM. También se revisaron los medicamentos.	Mejora del paciente al administrar su medicación, evitaron PRM, hubo una mejora de la automedicación.

Reidt <i>et al.</i> 2014 (25)	Estudio prospectivo	N= 533 Gi: n= 153 H/M= 45/108 Edad= 18-65 Gc: n= 380 H/M= 132/248 Edad= 18-65	Polimedicados	EE. UU.	Periodo de reclutamiento: 01/2009 al 12/2010 Periodo de seguimiento: 60 días	Modelo de atención medica domiciliaria con un farmacéutico para los ajustes de dosis, interrupción de medicamentos, monitoreo y para detectar y prevenir PRM y RAM.	No hubo diferencias significativas en los reingresos hospitalarios. Se identificaron más PRM y antes.
Kogut <i>et al.</i> 2014 (26)	Estudio descriptivo transversal	N=30 H/M= 16/14 Edad= 65	Enfermedades crónicas	EE. UU.	Periodo de seguimiento: 08/2011 al 02/2012	Revisión de la medicación para identificar PRM y utilización de un sistema electrónico de registro de salud personal en el hogar.	Se identificó muchos PRM y se solucionaron. El sistema electrónico fue eficaz pero no hubo suficiente muestra para sacar conclusiones.
Kalyango <i>et al.</i> 2012 (27)	Estudio descriptivo transversal	N= 207 H/M= 70/137 Edad= 49 ± 17,1	Enfermedades crónicas, artritis, tiroides, diabetes...	Uganda	Periodo total: 06/2010 al 07/2010	Visita a domicilio para hacer unas entrevistas e informar sobre el correcto almacenamiento de medicamentos.	Se mejoró el almacenamiento de medicamentos, se les administro un horario para su administración y se informó de la práctica inadecuada de estos.
El Hajj <i>et al.</i> 2012 (28)	Estudio de seguimiento	N= 297 H/M= 199/98 Edad= 18 - 50	Ninguna	Qatar	Periodo total: 5 meses	Opiniones del público por realizar pruebas diagnósticas en casa por farmacéuticos.	Se observó poca actitud e interés por parte de los farmacéuticos para realizar pruebas diagnósticas.

Kwint <i>et al.</i> 2012 (29)	Estudio descriptivo transversal	N= 155 H/M= 71/84 Edad= 76	Ancianos polimedica- dos y que usan cardiovascul ares o antidiabético s	Países Bajos	Periodo de reclutamiento: 02/2008 al 08/2010 Periodo de seguimiento: 12 meses	Revisiones para reducir los PRM, controlar el colesterol y la HTA en el hogar.	Se mejoró la identificación de PRM y hubo un mayor y mejor control de la medicación. Los pacientes se quejaban de la falta de pruebas para HTA y colesterol.
Lee <i>et al.</i> 2012 (30)	Estudio de grupos focales	N= 32 H/M= 17/15 Edad= 65-86	Polimedica- dos	Australia	Periodo de reclutamiento: 12/2009 al 08/2010	Revisión medicamentos en aldeas.	Hubo problemas para captar pacientes que quisieran un servicio de revisión de medicamentos, pero mejoró el conocimiento y la adherencia de medicamentos.
Elliott <i>et al.</i> 2012 (31)	Estudio comparativo aleatorizado	N= 80 Gi: n=40 H/M= 14/26 Edad= 85,5 Gc: n= 40 H/M= 15/25 Edad= 83,0	Ancianos	Australia	Periodo de reclutamiento: 08/2009 al 04/2010 Periodo de seguimiento: 20 semanas	Revisión integral a domicilio de medicamentos, detección de PRM y recomendaciones.	Se detectó PRM, se eliminó los medicamentos sobrantes y se dio educación sobre los medicamentos.
Fikri- Benbrahim <i>et al.</i> 2012 (32)	Estudio quasi-experimental	N= 176 H/M= 66/110 Edad= 62,0 ±11,6	Hipertensión arterial	España	Periodo de reclutamiento: 1 mes Periodo de seguimiento: 20 semanas	Monitoreo de hipertensión arterial en el hogar.	Aumentó la adherencia y mejoró el control de la presión arterial.

Stafford <i>et al.</i> 2012 (33)	Ensayo de cohorte prospectivo no aleatorizado y controlado	N= 268 GI: n= 129 H/M= 77/52 Edad= 67,7 GC: n= 139 H/M= 83/56 Edad= 66,2	Pacientes tratados con Warfarina	Australia	Periodo de reclutamiento: 11/2008 al 12/2009	El paciente recibió instrucciones a domicilio por el farmacéutico para la Warfarina después del alta.	Se creó un mejor conocimiento de la Warfarina y mejoró la terapia con ella.
Sheridan <i>et al.</i> 2012 (34)	Estudio piloto	N= 27 H/M= 8/19 Edad= 75	Polimedicados	Nueva Zelanda	Periodo de reclutamiento: 10/2007 al 09/2008 Periodo de seguimiento: 12 meses	Análisis de una revisión del uso de medicamentos a domicilio, su conocimiento y adherencia	Los pacientes dijeron tener mayor conocimiento y adherencia, aunque la captación de pacientes fue complicada
Roughead <i>et al.</i> 2011 (35)	Estudio de cohorte retrospectivo	N= 17136 Gi: n=816 H/M= 64/752 Edad= 81,6 Gc: n=16320 H/M= 65/16255 Edad= 81,4	Veteranos de guerra con Warfarina	Australia	Periodo total: 01/2004 al 07/2006 Periodo de seguimiento: 12 meses	Visita a domicilio cada 2-6 meses para una educación de uso de medicamentos, detección de PRM y una revisión exhaustiva de la receta médica.	Se aumento la hospitalización por la mayor información de RAM. Se mejoró la oportunidad de enseñar y aconsejar al paciente.
Flanagan <i>et al.</i> 2010 (36)	Estudio de cohorte	N=836 H/M= 333/503 Edad= 80,3	Ancianos polimedicados	EE. UU.	Periodo total: 04/2005 al 03/2007	Programa de administración de medicamentos a domicilio para evaluar el régimen de medicamentos para identificar y resolver PRM.	Se usó menos los recursos de salud, se redujeron los costes y se aceptaron las recomendaciones para mejorar la idoneidad de la medicación

Hugtenburg <i>et al.</i> 2009 (37)	Estudio de intervención controlada	N=715 Gi: n=336 H/M= 164/172 Edad= 69,7 ± 15,0 Gc: n= 379 H/M= 177/202 Edad= 72,7 ± 11,2	Polimedicados	Países Bajos	Periodo de reclutamiento: 2001 al 2003 Periodo de seguimiento: 9 meses	Desarrollo de un protocolo de intervención de medicamentos a domicilio para revisarlos y dar información sobre su correcto uso.	El protocolo creó un control de medicamentos dispensados y mejoró la información recibida a los pacientes, pero hubo una tasa alta de baja adherencia en pacientes crónicos.
Moultry <i>et al.</i> 2008 (38)	Estudio descriptivo transversal	N= 18 H/M= 7/11 Edad= 71-80	Polimedicados	EE. UU.	Periodo de reclutamiento: 05/2006 al 05/2007	Encuesta a participantes después de la terapia de gestión de medicamentos en el hogar y de una revisión de medicamentos.	Hubo una falta de conocimientos en los farmacéuticos, pero obtuvieron éxito en la terapia de gestión de medicamentos y de la información a los pacientes.
Holland <i>et al.</i> 2007 (39)	Ensayo aleatorio controlado	N=291 GI: n= 148 H/M= 94/54 Edad= 77,6 ± 9,0 GC: n= 143 H/M= 90/53 Edad= 76,4 ± 9,5	Insuficiencia cardiaca	Reino Unido	Periodo de reclutamiento: 12/2003 al 03/2005 Periodo de seguimiento: 6 meses	Visita domiciliaria de farmacéuticos para dar información sobre la insuficiencia cardiaca, su medicación, dieta y ejercicio. Se creó unas tarjetas de monitoreo diario de signos y síntomas.	No hubo reducción en los ingresos hospitalarios ni tubo efecto sobre la mortalidad.
Salter <i>et al.</i> 2007 (40)	Análisis discursivo	N= 29 H/M= 11/18 Edad= 83,3	Polimedicados ingresados previamente en hospital	Reino Unido	Periodo de reclutamiento: 10/2002 al 12/2002	Revisión de medicamentos a domicilio.	La información facilitada por los farmacéuticos no siempre fue aceptada. Por el contrario, la información e instrucciones sobre los medicamentos sí.

Triller <i>et al.</i> 2007 (41)	Ensayo aleatorio controlado	N= 154 Gi: n= 77 H/M= 21/56 Edad= 81,3 ± 9,3 Gc: n=77 H/M= 22/55 Edad= 78,1 ± 11,2	Insuficiencia cardiaca	EE. UU.	Periodo de reclutamiento: 06/2002 al 05/2004 Periodo de seguimiento: 6 meses	A los pacientes se les dio en sus casas sugerencias de cambios de hábitos como fumar y una dieta equilibrada. Se les ayudó con la adherencia y con el uso inapropiado de medicamentos.	No hubo diferencias significativas entre el grupo de intervención y el grupo control con respecto a las muertes y a la hospitalización.
Sorensen <i>et al.</i> 2006 (42)	Estudio descriptivo transversal aleatorizado	N=204 H/M= 144/60 Edad= 72	Polimedicados mal controlados	Australia	No consta	Revisión de medicamentos duplicados y caducados, adherencia, creación de un botiquín, creación de una rutina de medicación y educación sobre genéricos y comerciales.	Hubo una mejor adherencia a los medicamentos, se eliminó el riesgo de confusión con los medicamentos caducados y el riesgo de duplicidad de dosis.
Zillich <i>et al.</i> 2005 (43)	Ensayo aleatorio controlado	N= 125 Gi: n= 64 H/M= 27/37 Edad= 64,0 ±11,1 Gc: n= 61 H/M= 22/39 Edad= 66,1 ± 13,8	Hipertensión	EE. UU.	Periodo de seguimiento: 3 meses	Se proporciono información educativa sobre la enfermedad el uso de medicamentos y su adherencia, se recomendaron cambios en el estilo de vida y se enseñó la medición de la tensión a domicilio.	Hubo una reducción de la presión arterial tomada en el hogar y reducción de efectos cardiovasculares. Hubo mucha aceptación por parte de médicos y pacientes de los consejos farmacéuticos.

Sorensen <i>et al.</i> 2004 (44)	Ensayo aleatorio controlado de efectividad	N= 392 Gi: 176 H/M= 113/63 Edad= 72,3 GC: 216 H/M= 152/64 Edad= 71,4	Polimedicados	Australia	Periodo total: 02/1999 al 05/2000 Periodo de reclutamiento: 08/1999 al 05/2000 Periodo de seguimiento: 8 semanas	Visitas a domicilio para revisar la medicación con un equipo multidisciplinario	Hay mejoras en los resultados clínicos y los costes. Se redujeron los PRM y se aumentó la adherencia a la medicación.
Peterson <i>et al.</i> 2004 (45)	Ensayo aleatorio controlado prospectivo	N= 81 Gi: n= 39 H/M= 22/17 Edad= 65,5 ± 11,0 Gc: n= 42 H/M= 29/13 Edad= 63,5 ± 12,1	Dislipemia	Australia	Periodo de reclutamiento: 04/2001 al 10/2001 Periodo de seguimiento: 6 meses	En los domicilios de los pacientes se determinó el colesterol y se registró un régimen de medicación. Se educó sobre los objetivos y beneficios de la reducción de lípidos y de la modificación del estilo de vida	Mejor control de la dislipemia y una disminución significativa en el colesterol total.
Triller <i>et al.</i> 2003 (46)	Estudio descriptivo transversal	N= 80 H/M= No consta Edad= No consta	Polimedicados crónicos	EE. UU.	Periodo de reclutamiento: 07/2001 al 03/2002	Revisión de medicamentos a domicilio, se descartaron los caducados, se educó sobre sus medicamentos y su autoadministración. Se hicieron recomendaciones para reducir PRM.	Se pudo identificar y resolver PRM y hubo una mejora del cumplimiento.

Naunton <i>et al.</i> 2003 (47)	Estudio aleatorio controlado	N=121 Gi: n= 57 H/M= 23/34 Edad= 74 Gc: n=64 H/M= 20/44 Edad= 77	Ancianos polimedicados crónicos	Australia	Periodo de reclutamiento: 11/2000 al 12/2001 Periodo de seguimiento: 95 días	Visita domicilio para educar a los pacientes sobre sus medicamentos, para responder dudas, para mejorar la adherencia y para detectar PRM	Hubo una reducción de PRM, reingresos hospitalarios y un mejor cumplimiento. Se les recomendó a los médicos acciones terapéuticas y las implementaron.
Nazareth <i>et al.</i> 2001 (48)	Ensayo aleatorio controlado	Intervención farmacéutico hospitalario N= 145 H/M= No consta Edad= No consta Intervención farmacéutico comunitario N= 129 H/M= No consta Edad= No consta	Ancianos hospitalizados	Reino Unido	Periodo de reclutamiento: 05/1995 al 03/1997 Periodo de seguimiento: 6 meses	Primero a los pacientes los llevó un farmacéutico hospitalario y después del alta un farmacéutico comunitario a domicilio para ver el cambio de medicación, su comprensión y la adherencia.	No hubo evidencias de mejora con este plan de actuación, independientemente del farmacéutico hospitalario o comunitario.
Raynor <i>et al.</i> 2000 (49)	Estudio piloto	N= 143 H/M= 30/113 Edad= 77,0 ± 6,89	Ancianos polimedicados	Reino Unido	No consta	Se hizo una revisión a domicilio de la medicación, de la adherencia, identificación de PRM y se elaboró un plan de acción con un seguimiento.	Hubo una disminución en el número de medicamentos recetados. Redujeron los PRM y mejoró la educación de los pacientes.

Read <i>et al.</i> 1998 (50)	Estudio descriptivo transversal	N=96 H/M= 28/68 Edad= 60,4	Dolor crónico	Reino Unido	Periodo de seguimiento: 4-6 semanas	Entrevistas para calificar el dolor de los pacientes y las intervenciones para aliviarlo o evitar RAM e interacciones con otros medicamentos.	Se identificó AINES inapropiados, medicamentos no recetados o naturales con posibles interacciones y duplicaciones de dosis. Se educó sobre el buen uso, interacciones y dosis de sus medicamentos y se les ayudó a encontrar la medicación ideal para aliviar el dolor.
Stewart <i>et al.</i> 1998 (51)	Ensayo aleatorio controlado	N= 762 Gi: n= 381 H/M= 193/188 Edad= 66,0 ± 15,7 Gc: n= 381 H/M= 191/190 Edad= 65,3 ± 15,8	Ancianos polimedicado s crónicos	EE. UU.	Periodo de reclutamiento: 12 meses Periodo de seguimiento: 6 meses	Visita a domicilio para asegurarse de un buen manejo del medicamento, detección de PRM ocultos y para aumentar la vigilancia al paciente.	Hubo una reducción de muertes fuera del hospital y aunque también disminuyó el porcentaje de reingresos en 6 meses, después hubo un reingreso similar entre los expuestos y los no expuestos a la visita a domicilio.

Hsia Der <i>et al.</i> 1997 (52)	Estudio prospectivo con comparación pre-post	N=20 H/M=20/0 Edad= 75,1	Ancianos polimedicados	EE. UU.	Periodo de recolección de datos: 11/1994 al 04/1995 Periodo de reclutamiento: 18 meses Periodo de seguimiento: 4 semanas	Revisión de medicamentos a domicilio, detección de PRM, revisión de botiquines y educación de su medicación en visitas domiciliarias.	Mejor cumplimiento, eliminación de medicamentos caducados o innecesarios, mejora de la adherencia. Los farmacéuticos contribuyen a disminuir la mala gestión farmacéutica en el hogar
Begley <i>et al.</i> 1997 (53)	Estudio piloto	N= 190 Gi: n= 61 H/M= 24/37 Edad= 84 GcV: n= 63 H/M= 22/41 Edad= 81 GcNV: n=66 H/M= 29/37 Edad= 82	Ancianos polimedicados	Reino Unido	Periodo de reclutamiento: 5 meses Periodo de seguimiento: 12 meses	Al grupo de intervención se le revisó los medicamentos a domicilio, se evaluó los conocimientos del paciente, la destreza para abrir las cajas de medicamentos y la adherencia. Se les educó para un correcto uso.	Hubo un efecto positivo sobre el conocimiento de los medicamentos y su uso seguro, pero aún se podía mejorar. No hubo una adherencia absoluta, pero mejoró la que ya tenían los pacientes.
<p>PRM = Problemas relacionados con el medicamento HTA = Hipertensión Arterial RAM = Reacción adversa a la medicación INR = Monitoreo del índice de normalización internacional SNC = Sistema nervioso central AINES= Fármacos antiinflamatorios no esteroideos</p>							

Tabla 2. Análisis de la calidad metodológica de los estudios a través de los 22 puntos de valoración de la guía STROBE (8)

Artículo	Puntuación de los puntos del cuestionario ^a																						TOTAL	% ^b
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Daliri <i>et al.</i> (10)	1	1	1	1	1	0,5	1	0	1	1	NA	0,4	1	0,6	1	0,6	1	1	1	1	1	1	18,2	86,8
Papastergiou <i>et al.</i> (11)	0,5	1	1	1	0	0,5	1	0	0	0	NA	NA	0	0,6	1	0,3	0	1	0	1	1	1	11	55
Fujita <i>et al.</i> (12)	1	1	1	1	1	0,5	1	0	1	1	NA	NA	0,3	0,3	1	0	1	1	0	1	1	1	15,2	76
Toivo <i>et al.</i> (13)	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	NA	NA	1	1	1	0,6	1	1	1	1	1	1	17,6	88
Kayyali <i>et al.</i> (14)	0,5	1	1	1	0	0,5	1	1	0	0	NA	NA	0	0,6	1	0	1	1	0	0	1	1	11,6	58
Corsi <i>et al.</i> (15)	1	1	1	1	0	0,5	1	0	0	0	NA	NA	0,3	0,6	1	0	0	1	1	1	1	1	12,5	62,5
Clifton <i>et al.</i> (16)	0,5	1	1	1	1	0,5	0	0	1	0	NA	NA	0,6	0,6	1	0,3	0	1	1	1	1	1	13,6	68
Wallus <i>et al.</i> (17)	1	1	1	1	0	0,5	1	0	0	0	NA	NA	1	0,6	1	0,6	1	1	1	1	1	1	14,8	74,1
Elliott <i>et al.</i> (18)	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	NA	NA	0,3	0,6	1	0,6	1	1	1	1	1	1	13,6	68
Ong <i>et al.</i> (19)	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	NA	NA	0	0,6	1	0,6	0	1	1	1	1	0	15,8	79
Basheti <i>et al.</i> (20)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NA	NA	1	0,6	1	0	1	1	1	1	1	1	18,6	93
Steele <i>et al.</i> (21)	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	NA	NA	0,6	0,6	1	0	0	1	1	1	1	0	13,3	66,5

Kalista <i>et al.</i> (22)	0,5	1	1	1	1	0,5	1	0	1	0	NA	NA	0,3	0,6	1	0	0	1	1	1	1	1	1	14	70
Carter <i>et al.</i> (23)	0,5	1	1	1	1	0,5	1	0	1	1	NA	NA	0	0,6	1	0,6	1	1	1	1	1	1	1	16,3	81,5
Pherson <i>et al.</i> (24)	1	1	1	1	0	0,5	1	0	0	0	NA	NA	0,6	0,6	1	0	1	1	1	0	1	0	11,8	59	
Reidt <i>et al.</i> (25)	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	NA	NA	0	0,6	1	0,6	1	1	1	1	0	1	14,3	71,5	
Kogut <i>et al.</i> (26)	1	1	1	1	0	0,5	1	0	1	0	NA	NA	0,6	0,6	1	0,3	0	1	1	0	1	1	13,2	66	
Kalyango <i>et al.</i> (27)	1	1	1	1	0	0,5	1	0	1	0	NA	NA	0	0,6	1	0,6	0	1	0	1	1	1	12,8	64	
El Hajj <i>et al.</i> (28)	0,5	1	1	1	0	0,5	1	0	1	0	NA	NA	0,3	0,6	1	0	1	1	1	1	1	1	14	70	
Kwint <i>et al.</i> (29)	1	1	1	1	1	0,5	1	0	1	0	NA	NA	1	0,6	1	0,6	1	1	1	1	1	1	16,8	84	
Lee <i>et al.</i> (30)	1	1	1	1	1	0,5	1	0	0	0	NA	NA	0,6	0,6	1	0	1	1	1	1	1	1	14,8	74	
Elliott <i>et al.</i> (31)	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	NA	NA	1	0,6	1	0,6	0	1	1	1	1	1	15,3	76,6	
Stafford <i>et al.</i> (33)	1	1	1	1	1	0,5	1	0	1	0	NA	NA	0	0,6	1	0,3	0	1	1	0	1	1	13,5	67,5	
Fikri-Benbrahim <i>et al.</i> (32)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,8	0,6	1	1	0,3	1	1	1	1	1	1	20,8	94,5	
Sheridan <i>et al.</i> (34)	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	NA	NA	0	0,6	1	0	1	1	1	1	1	1	14,6	73	
Roughead <i>et al.</i> (35)	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	NA	NA	0	0,6	1	0,3	0	1	1	1	1	1	14	70	
Flanagan <i>et al.</i> (36)	0,5	1	1	0	1	0,5	1	1	0	0	NA	NA	0,6	0,6	1	0,3	0	1	1	1	1	0	12,6	63	

Hugtenburg <i>et al.</i> (37)	1	1	1	1	1	0,5	1	1	0	1	NA	NA	0	0,6	1	0	1	1	1	1	1	1	1	16,1	80,5
Moultry <i>et al.</i> (38)	1	1	1	1	0	0,5	1	0	1	0	NA	NA	0,3	0,6	1	0	0	1	1	1	1	1	1	13,5	67,5
Holland <i>et al.</i> (39)	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	NA	NA	1	0,6	1	0,6	1	1	1	0	1	1	1	15,3	76,5
Salter <i>et al.</i> (40)	1	1	1	1	0	0,5	1	0	1	1	NA	NA	0	0,6	1	0	0	1	1	1	1	1	1	14,2	71
Triller <i>et al.</i> (41)	0,5	1	1	1	0	1	1	1	0	1	NA	NA	0,3	0,6	1	0,3	0	1	1	1	1	1	1	14,8	74
Sorensen <i>et al.</i> (42)	1	1	1	1	0	0,5	1	0	0	1	NA	NA	0	0,6	1	0,6	0	1	1	0	1	0	1	11,8	59
Zillich <i>et al.</i> (43)	0,5	1	1	1	0	1	1	1	1	0	NA	NA	0	0,6	1	0,3	0	1	1	1	1	1	1	14,5	72,5
Sorensen <i>et al.</i> (44)	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	NA	NA	1	0,6	1	0,6	1	1	1	1	1	1	1	18,3	91,5
Peterson <i>et al.</i> (45)	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	NA	NA	1	0,6	1	0,6	0	1	1	1	1	1	1	17,8	89
Triller <i>et al.</i> (46)	0,5	1	1	1	0	0,5	1	0	1	0	NA	NA	0	0,3	1	0	1	1	1	0	1	1	1	12,3	61,5
Naunton <i>et al.</i> (47)	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	NA	NA	0,6	0,6	1	0,3	1	1	1	1	1	1	1	15,6	78
Nazareth <i>et al.</i> (48)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	NA	NA	1	0,6	1	0,6	0	1	0	1	1	1	1	16,3	81,5
Raynor <i>et al.</i> (49)	0,5	1	1	1	0	1	1	0	0	0	NA	NA	0,6	0,6	1	0	0	1	1	0	1	1	1	11,8	59
Read <i>et al.</i> (50)	0,5	1	1	1	0	0,5	1	0	1	0	NA	NA	0,6	0,6	1	0,3	1	1	0	0	1	1	1	12,6	63
Stewart <i>et al.</i> (51)	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	NA	NA	0	0,6	1	0,6	1	1	1	1	1	1	1	16,3	81,5

Hsia Der <i>et al.</i> (52)	1	1	0	1	1	0,5	1	0	1	0	NA	NA	0	0,6	1	0,6	1	1	1	1	1	0	13,8	69
Begley <i>et al.</i> (53)	0,5	1	0	1	1	1	1	1	1	1	NA	NA	0,6	0,6	1	0,3	0	0	1	1	1	0	14,1	70,5
^a 0 = no cumple el ítem ni ninguna de sus partes; 1 = cumple el ítem en su totalidad; 0 a 1 = Cumple parcialmente el ítem; NA = no aplica. ^b = Porcentaje de cumplimiento del total de ítems, excluyendo los que no aplican (NA).																								

