

Dermatosis terra firma-forme

Terra firma-forme dermatosis

Sr. Editor:

La Dermatosis terra firma-forme o dermatosis neglecta, es una entidad de etiología incierta¹ que se caracteriza por la presencia de placas hiperpigmentadas, de superficie papilomatosa y aspecto sucio, que no pueden ser eliminadas con el lavado habitual pero que desaparecen totalmente tras el frotamiento con alcohol etílico al 70%. Se produce por un retraso en la maduración de los queratinocitos, con retención de melanina y acumulación de sebo, sudor y corneocitos en regiones con menor higiene o en zonas de hiperestesia².

Presentamos el caso de una niña de 14 años, sin antecedentes personales de interés, que es remitida para valoración de lesiones cutáneas. Como antecedentes familiares, destaca la presencia de dos familiares de segundo grado con diabetes tipo 2. Desde hace 4 meses, refieren presencia de placas hiperpigmentadas en abdomen y antebrazos similares a suciedad pero que no desaparecen con el lavado habitual. A la exploración física, se observan lesiones de aspecto reticulado, marronáceas y papilomatosas al tacto en abdomen y antebrazos (figura 1). El resto de la exploración física es normal. Se realiza la maniobra diagnóstico-terapéutica de fricción con algodón y alcohol etílico al 70%, desapareciendo las lesiones y confirmandose el diagnóstico.

Respecto al diagnóstico diferencial, es preciso distinguirla de otras entidades como la papilomatosis reticular y confluyente de Gougerot y Carteaud³, la acantosis nigricans, las queratosis seborreicas y los nevus epidérmicos.

La papilomatosis reticular se caracteriza por múltiples pápulas pigmentadas verrugosas localizadas fundamentalmente en el tronco. En la acantosis nigricans, se objetiva hiperpigmentación principalmente en los pliegues cutáneos. Los nevus epidérmicos están bien delimitados, con tendencia a seguir una distribución lineal en las líneas de Blaschko. Por otro lado, la dermatitis seborreica, aparece en forma de placas eritematosas con descamación fina y amarillenta cursando en




Figura 1. A: Lesión hiperpigmentada en abdomen de la paciente. **B:** Lesión hiperpigmentada en antebrazo de la paciente, con área de normalidad clínica en tercio superior tras ser frotada con alcohol etílico al 70%.

brotos. La dermatosis terra firma-forme, por tanto, es una entidad a tener en cuenta por su capacidad para simular otras dermatosis. Su diagnóstico precoz evitará pruebas complementarias complejas e innecesarias.

Teresa Atienza Almarcha^a, Julia Gramage Tormo^b, Mercedes Juste Ruiz^c, Ana Pilar Nso-Roca^d.

^aPediatría. Centro de Salud Juan XXIII. Alicante.

^bPediatría. Hospital Villajoyosa. Alicante.

^cJefa de Servicio de Pediatría. Hospital Universitario San Juan de Alicante. Alicante.

^dPediatría. Hospital Universitario San Juan de Alicante. Alicante.

Referencias

1. Guarneri C, Guarneri F, Cannavò SP. Terra firma-forme dermatosis. *Int J Dermatol.* 2008;47:482-4.
2. Akkash L, Badran D, Al-Omari AQ. Terra Firma forme dermatosis. Case series and review of the literature. *Dtsch J Dermatol Ges.* 2009;7:102-7.
3. Berk DR. Confluent and reticulated papillomatosis response to 70% alcohol swabbing. *Arch Dermatol.* 2011;147:247-8.

Correspondencia:
Ana Pilar Nso Roca
ananso@yahoo.es